SONOSCANNER

Premium Diagnostic Ultrasound

Un examen échographique

Etienne Richard, Directeur

@sonoscanner

Webinar

11 Septembre 2019

Avec le Dr Hervé Picard
Médecin Généraliste Echographiste

Bienvenue

L'échographie en Médecine Générale

Echographie Abdominale

L'échographie pulmonaire

Phlébites et autres exemples cliniques concrets

Nos 3 Objectifs:

Vous donner des informations

Vous montrer la pratique

Répondre à vos questions

Sonoscanner:

Spécialiste de l'échographie innovante

Trois échographes dédiés

Des services performants

=> Depuis un an 241 médecins et 26 hôpitaux équipés

L'utilisation en Médecine Générale:

Enrichissement pratique clinique
Meilleur service pour les patients
Un investissement maîtrisé

« Je réalise 4 à 5 échographies par jour et mes patients profitent d'un diagnostic immédiat », Dr Athouel

4 indications principales:

Epanchement (pleural, péritonéal, péricardique)

Dilatation des cavités pyélocalicielles

Affirmer une phlébite

Nodule thyroïdien

⇒ « *Dés que je soupçonne une phlébite, j'utilise mon échographe* », Dr Bui

La mise en pratique

Installation personnalisée

Formation pratique et continue

Des actes cotés

⇒ « 100% des Médecins interrogés trouvent que l'échographie a amélioré leur exercice », Thèse du Dr Elsa Many

Ils en parlent...

« En situation d'urgence mon échographe Sonoscanner est devenu indispensable. De par sa rapidité et sa portabilité, il permet d'orienter le malade et de gagner un temps précieux »

Dr Assez à Lille

« L'échographe de Sonoscanner est très simple à utiliser, une journée de formation m'a suffi pour être opérationnel. Je profite des formations Sonoscanner deux fois par an pour élargir mes compétences »

Dr Avenin à Bois-le-Roi

Webinar Sonoscanner L'abdomen

Initiation à l'orientation écho-clinique

Par le Dr Hervé Picard, Paris

SONOSCANNER
Premium Diagnostic Ultrasound

- ▶ Privilégier les exercices pratiques plutôt que la théorie
- ▶ Accessible à ceux qui n'ont jamais tenu une sonde & utile à ceux qui ont déjà un certain niveau de pratique
- ▶ Approche écho-clinique en soins primaires (différente de l'approche du radiologue)
- ▶ Répondre simplement à des questions simples oui/non grâce à l'écho

Bases de l'échographie (théorie)

Point de vue naif sur l'image écho

- Une "tranche" de patient
- Dynamique et en temps réel
- Avec des artéfacts

DONC

- Savoir orienter sa sonde et s'orienter
- Couper plusieurs tranches perpendiculaires du même organe, et être sûr qu'on a visualisé tout l'organe
- Connaître les principaux artéfacts

S'orienter

Dr Hervé Picard, Paris

Plan sagittal

Dr Hervé Picard, Paris

Plan transverse

Dr Hervé Picard, Paris

La tête du patient est « derrière l'écran »

Les pieds du patients sont « devant l'écran »

Droite

Gauche

Manier la sonde

- Translation
- Roulis, tangage et lacets

FIG. 49. - Les causes du MAL DE MER.
A, le tangage; B, le roulis.

Principes de formation de l'image

- Propagation des ultrasons: *tout se passe comme si...*
 - Dans l'eau : ils traversent sans renvoyer d'échos
 - Dans l'air : ils ne passent pas et sont réfléchis
 - Dans l'os : ils ne passent pas et sont absorbés
 - Dans les tissus : ils passent et renvoient plus ou moins d'échos
- Atténuation avec la profondeur (compensation par l'appareil)
- Le temps de retour des échos indique la distance (et parfois, la machine se trompe)

Artéfacts « d'absorption » »

Renforcement postérieur

Cône d'ombre

Quelques autres artéfacts

Dr Hervé Picard, Paris

- De reverberation
- Ombres de bord
- Images miroir

Choix de la sonde et des réglages

- Plus la fréquence est élevée :
 - moins on voit loin
 - mais plus on voit les détails
- On voit mieux dans la zone de focalisation
- Donc
 - changer de sonde si nécessaire
 - régler la profondeur
 - régler la focale (si pas de réglage automatique)
- Contraste / échelle de gris / TGC
 - le plus simple est d'avoir des *presets*
 - quand on débute, tendance à faire « trop blanc »

Echo abdo élémentaire pour le MG (théorie)

Questions à réponses « oui (sûr) / non (sûr) »

Si c'est oui, c'est oui et si c'est non, c'est non. Courbe d'apprentissage estimée entre 20 et 50 examens selon les études.

- ▶ Reins et voies urinaires :
 - ▶ Existe-t-il un globe vésical ?
 - ▶ Les voies excrétrices sont-elles dilatées ?
- ▶ Aorte abdominale :
 - ▶ Existe-t-il un anévrisme ?
- ▶ Veine cave inférieure :
 - ▶ La volémie est-elle apparemment normale, diminuée ou augmentée ?
- ▶ Epanchements :
 - ▶ Existe-t-il un épanchement (Morison, Douglas, Kohler)

Vessie normale pleine (F)

Globe massif (H)

Dilatation pyélocalicielle

Dr Hervé Picard, Paris

Rein droit normal

Rein droit CPC dilatées

Anévrisme aorte abdominale - pourquoi ?

Aten Primaria. 2019 Jan;51(1):11-17. doi: 10.1016/j.aprim.2017.10.005. Epub 2017 Dec 7.

[Validity of the abdominal ecography in primary care for detection of aorta abdominal aneurism in male between 65 and 75 years].

[Article in Spanish]

Bravo-Merino L¹, González-Lozano N², Maroto-Salmón R¹, Meijide-Santos G², Suárez-Gil P³, Fañanás-Mastral A⁴.

⊕ Author information

Abstract

OBJECTIVE: To determine the usefulness of ultrasound examination in Primary Care (PC) for the detection of abdominal aortic aneurysm (AAA) in male patients from 65-75 years old, as well as the consistency between observers on the diagnosis between general practitioners and the reference specialty in this area, Vascular Surgery. To estimate the prevalence of AAA in that population and its association with risk factors.

DESIGN: Cross-sectional descriptive study.

LOCATION: Healthcare Centres of Coto and Calzada II (Gijón, Spain).

PARTICIPANTS: Males born between 1 January 1939 and 31 December 1950.

INTERVENTIONS: From the 2,511 males found, 407 were selected using stratified random sampling. Aortic diameter was measured, with those ≥ 3 cm and 20% from the < 3 cm being referred for a second measurement by a vascular surgeon.

VARIABLES: Dependent: presence/absence of aneurism. Independent: age, abdominal perimeter, smoking, arterial hypertension, diabetes, dyslipidaemia, familial cases of AAA, cerebrovascular accident, and coronary disease. The analysis was performed using Bayesian inference with models for proportions and a multivariate logistic regression.

RESULTS: From 304 ultrasound scans performed, 13 were referred with suspicion of AAA, and 63 with were within normal. The sensitivity was 93.3% and specificity 98.5% with a 95% credibility interval (CredI) of 75.4-99.9%, and 94.3-100%, respectively. The prevalence was 4.6% (95% CredI: 2.5-7.2%, and the intraclass correlation coefficient between PC and Vascular Surgery was 0.88 (95% CredI: 0.79-0.94). Age, smoking, dyslipidaemia, and diabetes tended to increase the odds of prevalence of AAA.

Anévrisme aorte abdominale

Dr Hervé Picard, Paris

Diamètre normal 14 à 22 mm

Aorte abdo diamètre normal

Clairement pathologique >30 mm

AAA thrombosé

Normalement : pulsatilité respiratoire de la VCI. Si disparaît : anormal

VCI de surcharge

VCI d'hypovolémie

Epanchements

Dr Hervé Picard, Paris

Espace de Morison

Espace de Kohler

Cul-de-sac de Douglas

Questions à réponses « oui (sûr) / NSP »

Si on le voit, c'est sûr que oui. Si on ne le voit pas, on ne sait pas (petit ? difficile à voir ? manque d'expérience ?)

- ▶ Foie :
 - ▶ Présence d'une lésion focale hépatique évidente / massive ?
 - ▶ Présence d'un gradient hépatorénal franc ?
- ▶ Vésicule biliaire :
 - ▶ Présence d'une lithias vésiculaire évidente / volumineuse ?
- ▶ Utérus :
 - ▶ Présence d'un DIU cuivre ? Si présent, en place ?
 - ▶ Présence d'une grossesse intra-utérine ? Si oui, MAF et ACF ?

Surprises possibles au niveau du foie

Lésion focale hépatique

Stéatose hépatique ?

Surprise possible au niveau de la VB

Lithiases évidentes

Surprises possibles au niveau de l'utérus

Dr Hervé Picard, Paris

DIU au cuivre (en place
<2.5 cm du fond)

GIU (env 7 SA)

Merci, pour aller plus loin...

Noter les dates des prochains webinar

Faites nous part de vos suggestions

Vous êtes client de Sonoscanner? Merci de votre confiance! Les ingénieurs, votre conseiller, à votre service. Le Club Utilisateur remonte les suggestions.

Vous n'êtes pas encore équipé d'un échographe? Rendez-vous de présentation, Opération spéciale rentrée.

Contactez Mme Berdichevski : 06 01 24 46 24 - m.berdichesvi@sonoscanner.fr

⇒ « *Il y a 4 jours, veille de weekend une patiente est venue avec suspicion de phlébite. J'aurais aimé avoir déjà l'échographe à ce moment là!* »,

Dr Marsaudon